


Siete consejos para hablar con su hijo

- Háblele a su hijo sin prisa, con pausas frecuentes. Cuando su hijo habla, déjelo terminar de hablar, esperando unos segundos antes de que Vd. comience a hablar. El hablar lento y relajado de los padres es mucho más eficaz que criticarle o decirle que "hable más despacio" o que "trate otra vez más despacio."
- Reduzca el número de preguntas que Vd. le haga a su hijo. Los niños hablan más libremente al expresar sus propias ideas en lugar de responder a preguntas de adultos. En lugar de hacerle preguntas, haga comentarios sobre lo que su hijo haya dicho, haciéndole saber de esa manera que Vd. le ha prestado atención.
- Utilice sus expresiones faciales y otras formas de lenguaje corporal para comunicarle a su hijo, cuando tartamudea, que a Vd. le importa el contenido de sus palabras más que su manera de hablar. ➡

- Aségurese de dedicarle a su hijo exclusivamente unos minutos a una hora regular todos los días, dejándole elegir lo que le gustaría hacer. Permítale dirigir las actividades, decidiendo si quiere hablar o no. Al hablarle durante este tiempo especial, utilice un hablar lento, tranquilo, relajado, y con pausas frecuentes.
- Procure que todos los miembros de la familia aprendan a escuchar y esperar su turno antes de hablar. A los niños, especialmente a los que tartamudean, se les hace más fácil hablar cuando no hay interrupciones y cuentan con la atención de los demás.
- Procure entender cómo Vd. se relaciona con su hijo. Déle a entender a su hijo, tantas veces como pueda, que Vd. le presta atención y que él no tiene que apresurarse al hablar. Hay que evitar la crítica, el hablar rápido, las interrupciones y las preguntas.
- Más que nada, hágale saber a su hijo que Vd. le acepta tal y como es. Tanto el hablar lento y relajado de los padres como lo que hacen para aumentar la confianza del hijo como hablador aumentarán la fluidez y reducirán el tartamudeo del hijo. Lo más importante, sin embargo, es el apoyo paterno del hijo, tartamudea este o no.



Nuevo Video!

Para mayor información solicite...

Si su hijo tartamudea: una guía para los padres
56 páginas Publicación No. 15 en español @ \$1.00 each \$ _____

La tartamudez y su niño
64 páginas Publicación No. 27 en español @ \$1.00 each \$ _____

Nuevo!! La tartamudez y su niño: una guía para la familia
30-minute VHS VIDEOTAPE en español
Videotape No. 72 @ \$5.00 each \$ _____

Enviar a: **Stuttering Foundation of America**
P.O. Box 11749, Memphis, TN 38111-0749

Total
Incluido \$ _____
Dolares americanos exclusivamente

Nombre _____

Dirección _____

Colonia _____

Ciudad _____

Estado y C.P. _____

País _____

CS48(SP) 9-01

Las contribuciones son deducibles de impuestos
y nos ayudan a continuar con nuestro trabajo.

**STUTTERING
FOUNDATION™**
A Nonprofit Organization
Since 1947—Helping Those Who Stutter

3100 Walnut Grove Road, Suite 603
P.O. Box 11749 • Memphis, TN 38111-0749

1-800-992-9392
www.stutteringhelp.org

CS48(SP) 9-01


Si Usted Cree Que Su Niño Tartamudea...

**STUTTERING
FOUNDATION™**
FUNDACION PARA LA TARTAMUDEZ DE AMERICA

www.stutteringhelp.org

¿Su hijo está tartamudeando?

Si su hijo tiene dificultad para hablar y tiende a hesitar o a repetir algunas sílabas, palabras o frases, puede tener un trastorno de ritmo o un problema de tartamudez. Pero también puede ser que simplemente esté pasando por un período de *disritmia* normal que la mayoría de los niños experimentan cuando aprenden a hablar. Este panfleto le ayudará a entender la diferencia entre la tartamudez y el desarrollo normal de lenguaje.



El niño normal con alteraciones de ritmo

1. El niño normal con alteraciones de ritmo ocasionalmente repite sílabas o palabras una o dos veces, co-co-cómo esto. Las disritmias pueden incluir titubeos, y empleo de “muletillas” como “eh,” “este,” “mm,” etc.
2. Los trastornos de ritmo ocurren más frecuentemente entre los 12 y 18 meses y los cinco años, y tienden a aparecer y desaparecer.


Son generalmente signo de que el niño está aprendiendo a usar el lenguaje de maneras nuevas. Si las disritmias desaparecen por varias semanas y luego reaparecen, puede estar pasando por un estadio diferente de aprendizaje.

El material de este folleto fue compilado por Dr. Barry Guitar, University of Vermont, y el Dr. Edward G. Conture, Vanderbilt University, y traducción por Martha Tarasco, M.D.

El niño con tartamudez moderada

1. Un niño con tartamudez moderada repite sonidos más de dos veces co-co-co-cómo esto. Se evidencia tensión y dificultad en los músculos faciales, especialmente alrededor de la boca.
2. El tono de la voz puede elevarse con las repeticiones y ocasionalmente el niño experimentará un “bloqueo,” ningún flujo aéreo ni voz por varios segundos.
3. Trate de servirle como modelo, con un lenguaje lento y relajado, cuando platique con él, y aliente a otros miembros de la familia a hacer lo mismo. No hable tan despacio que suene anormal, sino mantenga una actitud sin prisa, con muchas pausas. El “Tío Gambino” de la televisión es un buen ejemplo de este estilo de lenguaje.
4. El lenguaje lento y relajado puede ser muy efectivo cuando se combina con algún tiempo diario en que el niño tiene la atención exclusiva de alguno de sus padres. Algunos minutos pueden reservarse diariamente en los que usted no haga nada más que escucharle a su hijo, para que él le cuente lo que a él se le ocurra.
5. Cuando su hijo le hable o le pregunte algo trate de hacer una **pausa** de aproximadamente un segundo, antes de contestar. Esto ayudará a que el lenguaje de su hijo esté menos presionado y sea más relajado.
6. Trate de no sentirse molesto ni sorprendido si la tartamudez aumenta su hijo está haciendo lo más que puede, mientras se habitúa al aprendizaje de nuevas destrezas de lenguaje, todo simultáneamente. Su actitud paciente de aceptación lo va a ayudar inmensamente.
7. Las repeticiones y prolongaciones de sonidos son la forma más sana de tartamudez. Es beneficioso todo lo que le ayude a su hijo a tartamudear así, en vez de tartamudear tensamente o evitando palabras.
8. Si su hijo está frustrado o molesto a, veces, cuando su tartamudez está peor, déle seguridad, algún niño responderá positivamente a algo como “Sé que es difícil hablar a veces”...pero mucha gente se bloquea cuando se les dice: “está bien.” Otros niños se sienten tranquilos cuando se les toca o se les da un abrazo, cuando se sienten frustrados.
9. Las disritmias pueden desaparecer y reaparecer, pero en este momento el niño tartamudea más de lo que habla de una manera normal.

El niño con tartamudez severa



1. Si su hijo tartamudea en más del 10% de su lenguaje, o con un esfuerzo considerable, o evita tartamudear cambiando palabras y empleando sonidos antes de iniciar el lenguaje, es signo de que necesita terapia de lenguaje. Son más frecuentes bloques completos de lenguaje, que repeticiones o prolongaciones. Pero se observan disritmias prácticamente en todas las situaciones de lenguaje.
2. Busque un especialista en foniatría certificado por el American Speech-Language-Hearing Association. O bien, póngase en contacto con la Fundación para la Tartamudez al 1-800-992-9392. Ellos pueden referirle a Instituciones y especialistas que podrán prestarle ayuda.
3. Las indicaciones que se aplican a los papás con niños que presentan tartamudez moderada son apropiadas también cuando el niño tiene un problema severo. Trate de recordar que hablando más lenta y relajadamente es mucho más útil que decirle al niño que hable más despacio.
4. Motive a su hijo a que le hable sobre su tartamudez. Muestre paciencia y aceptación mientras lo discute. Resolver la tartamudez está mucho más relacionado con perder el miedo, que con tratar de empeñarse en lograrlo motive a su hijo.